

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 356 /2012d z dnia 14 .12.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-6/2008 z dnia 22.01.2008 r.

Posiadacz zezwolenia:

ISK Biosciences Europe N.V. , Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa
Telefon: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska.**

A L T I M A 500 SC

Zawartość substancji czynnej:

fluazynam/N-(3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)-2-amino-3-chloro-4-trifluorometylopirydyna (związek z grupy pochodnych aniliny) - **500 g** w **1** litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R -6/2008 z dnia 22.01.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-155/2009 z dnia 06.10.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R -63/2011 z dnia 22.03.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 356/2012d z dnia 14 .12.2012 r.



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

alternarioza

Zalecane dawki: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek Altima 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

2. ROŚLINY WARZYWNE

A) CEBULA KONSUMPCYJNA

mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA

Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

B) CEBULA NASIENNA

mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA:

Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

C) KAPUSTA BIAŁA, KAPUSTA PEKIŃSKA

kiła kapusty

Dezynfekcja podłoża.

Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Podłoże (pole) opryskiwać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę wierzchnią do głębokości 10 cm.

Podlewanie.

Zalecane stężenie; 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą roślinę.

Podlewać rozsadę po posadzeniu na stałe miejsce.

III OKRES KARENCCI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

ziemniaki - 7 dni

cebula konsumpcyjna - 28 dni

kapusta - nie dotyczy

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napelnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04
 Kraków – (12) 411 99 99
 Lublin – (81) 740 89 83
 Łódź – (42) 657 99 00
 Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25
 Sosnowiec – (32) 266 11 45
 Tarnów – (14) 631 54 09
 Warszawa – (22) 619 66 54
 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
 Data produkcji -
 Zawartość netto -
 Nr partii -