

**Posiadacz zezwolenia:**

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Tel.: 22 326 06 01,  
Fax: 22 326 06 99.

## AMISTAR OPTI 480 SC

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.**

**Zawartość substancji czynnych:**

chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 400 g/l (32,8%),  
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 80 g/l (6,56%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 20 /2011 z dnia 07.03.2011 r.,  
zmienione decyzją MRiRW nr R - 130/2012d z dnia 19.06.2012 r.  
decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.  
oraz decyzją MRiRW nr R-283/2015d z dnia 23.04.2015 r.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
- H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261- Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280- Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

P302 + P352 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

## OPIS DZIAŁANIA

Amistar Opti 480 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w celu zwalczania alternariozy cebuli, mączniaka rzekomego, zgnilizny szyjki cebuli w uprawie **cebuli** z siewu, antraknozy fasoli, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej w uprawie **fasoli szparagowej**, askochytozy grochu, mączniaka rzekomego **grochu**, szarej pleśni, zarazy ziemniaka w uprawie **pomidora pod osłonami**, czerni krzyżowych, szarej pleśni i mączniaka rzekomego w uprawie **kalafiora** oraz alternariozy naci i mączniaka prawdziwego w uprawie **marchwi**. Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

## STOSOWANIE ŚRODKA

### Cebula

*alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, zgnilizna szyjki cebuli*

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.**

### Fasola

*antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa*

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy kwitnienia.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.**

### Groch

*askochytoza, mączniak rzekomy*

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju strąków.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.**

### Kalafior.

*czerni krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy.*

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**



**Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.**

**Marchew.**

*alternarioza naci, mączniak prawdziwy.*

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.**

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,5 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 – 2,5 l/ha.**

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

**Zalecana ilość wody: 700 l/ha.**

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

**Pomidor pod osłonami**

*szara pleśń, zaraza ziemniaka*

**Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:**

**0,25% (250 ml środka w 100 litrach wody).**

**Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania**

**0,2–0,25% (200–250 ml środka w 100 litrach wody).**

Wyższe stężenie środka stosować w okresie dużego zagrożenia chorobami.

Dawka cieczy użytkowej: 100 l /1000m<sup>2</sup>.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

**Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.**

**Uwagi:**

Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym sposobie działania.

Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

**SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

**POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY**

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu użyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

#### **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:**

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej

#### **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy grochu, fasoli, cebuli, marchwi i kalafiora:

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy grochu, fasoli, cebuli, marchwi i kalafiora:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej roślinnością o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

**Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):**

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

**Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

cebula, fasola, groch, kalafior, marchew – **14 dni**,

pomidor pod osłonami – **3 dni**.

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):**

nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:**

nie dotyczy

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:



- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
- W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

