

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-193/2012d z dnia 13.08.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 5/2004 z dnia 20.02.2004 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz,
Republika Austrii, tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o. o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, (0-22) 620 32 52,
fax: (0-22) 654 07 97, www.fnagro.pl.

Konfekcjoner:

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Agromix”, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.:0048 12
281 10 08, fax.: 0048 12 281 14 53.

AGROPAK sp.j. B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1D, 43-603 Jaworzno,
Tel.: +48 32 61 56 918 Fax: +48 32 615 63 30

**Przestrzegaj etykiety- środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

CHAMPION 50 WP

Zawartość substancji czynnej:

miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego) - 50 %.

**Zezwolenie MRiRW Nr R - 5/2004 z dnia 20.02.2004 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R- 22/2007 z dnia 31.01.2007 r.,
decyzją MRiRW Nr R- 325/2007 z dnia 09.07.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R-159/2008 z dnia 03.12.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R- 228/2009d z dnia 18.12.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-156/2011d z dnia 30.05.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-193/2012d z dnia 13.08.2012 r.**



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

Champion 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) ZIEMNIAK

zaraza ziemniaka

Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować przy większym nasileniu choroby i silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecana ilość wody 300-400 l/ha.

Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste lub średniokropliste.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym Champion 50 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

2. ROŚLINY SADOWNICZE

A) JABŁOŃ, GRUSZA

parch jabłoni, parch gruszy

Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Ze względu na możliwość wywołania poparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

B) JABŁOŃ

zaraza ogniowa

Zalecane dawki:

*** w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia: 1,5 kg/ha,**

*** w okresie wzrostu owoców: 0,75 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

C) GRUSZA

zaraza ogniowa

Zalecane dawki:

*** w okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia: 3 kg/ha,**

*** w okresie wzrostu owoców: 1,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

D) CZEREŚNIA, WIŚNIA

rak bakteryjny drzew pestkowych

1. Okres nabrzmiewania pąków i opadania liści.

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

2. Okres kwitnienia.

Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

3. ROŚLINY WARZYWNE

A) OGÓREK

bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak rzekomy dyniowatych

Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Środek stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7 dni, najpóźniej do okresu kwitnienia ogórków.

B) POMIDOR

bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka

Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Środek stosować 2-3-krotnie w odstępach co 7-10 dni. W przypadku dużego zagrożenia roślin zarazą ziemniaka środek Champion 50 WP należy stosować przemiennie z fungicydami o działaniu wgłębnym.

C) FASOLA

bakterioza obwódkowa fasoli, antraknoza fasoli

Zalecane dawki: 1,5-2 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać kiedy fasola jest w fazie rozwoju 1-2 pierwszych liści właściwych.

Środek stosować 1-2 razy co 7-10 dni.

UWAGI:

1. Środek zalecany głównie do zapobiegawczej ochrony warzyw przed chorobami bakteryjnymi.

2. W ogórku środek może powodować lekkie żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.

3. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK, JABŁOŃ, GRUSZA, CZEREŚNIA, WIŚNIA, OGÓREK, POMIDOR,
FASOLA - 7 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ,

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać pyłu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się czujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Kraków - (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów – (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 5 lat

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

