

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-75/2011d z dnia 22.03.2011 r.
zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R-61/2010 z dnia 02.07.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Industrias Químicas del Valles S.A., Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Królestwo Hiszpanii, tel.: 0034 93 579 66 77, fax.:0034 93 579 17 22, iqv@iqvagro.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S. A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

EKONOM MM 72 WP

Zawartość substancji aktywnych:

metalaksyl - DL -N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(2-metoksyacetylo) alaninian metylu;
(związek z grupy fenyloamidów) – **8%**,

mankozeb - kompleks cynku z manebem zawierający 20% manganu i 2,5% cynku;
(związek z grupy ditiokarbaminianów) - **64%**.

**Zezwolenie MRiRW nr R-61/2010 z dnia 02.07.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-75/2011d z dnia 22.03.2011 r.**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

EKONOM MM 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) ZIEMNIAK

alternarioza

Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach zagęszczonych.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na tę chorobę lub w warunkach dużego zagrożenia chorobą, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na liściach.

zaraza ziemniaka (zaraza występująca na liściach i łodygach)

Zalecana dawka: 2,0-2,5 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach dużego zagrożenia chorobą oraz na plantacjach zagęszczonych.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na uprawach zagęszczonych lub w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaka

Środek stosować do pierwszych zabiegów ochrony ziemniaka.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

* na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach

* na odmianach późniejszych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym regionie na odmianach wczesnych.

W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, opryskiwanie środkiem można powtórzyć po 10-14 dniach od pierwszego zabiegu. Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.

Kolejne zabiegi ochrony wykonywać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych.

2. ROŚLINY WARZYWNE

A) POMIDOR (W GRUNCIE)

zaraza ziemniaka

Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

B) OGÓREK (W GRUNCIE)

mączniak rzekomy

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

C) CEBULA (W GRUNCIE)

mączniak rzekomy

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.

D) ROŚLINY KAPUSTNE (ROZSADNIK)

mączniak rzekomy kapustnych

Zalecana dawka: 2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 400 l/ha.

Środek stosować 1-2 razy w sezonie, w odstępach co 7-10 dni.

Pierwsze opryskiwanie rozpocząć od fazy 2 liści rozsady.

UWAGI:

1. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

POMIDOR - 7 DNI,

OGÓREK - 3 DNI,

CEBULA - 14 DNI,

ZIEMNIAK - 14 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice i odpowiednie okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietkę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04
Kraków - (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83
Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Tarnów – (14) 631 54 09
Warszawa – (22) 619 66 54
Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -