

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-228/2010d z dnia 13.08.2010 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-52/2007 z dnia 21.12.2007 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c,
01-797 Warszawa. Tel.: (0 22) 320 09 00, fax: (0 22) 320 09 50,
e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Producent: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere
Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Tel.: +33-1-41-97-44-00, Fax.: +33-1-41-97-44-11

*Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.*

K O C I D E 1 0 1 W P

Zawartość substancji aktywnej:

miedź w postaci wodorotlenku miedziowego - **50%**.

Zezwolenie MRiRW Nr R-52/2007 z dnia 21.12.2007r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-228/2010d z dnia 13.08.2010 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze.

jabłoń.

-parch jabłoni.

-Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.

grusza.

-parch gruszy.

-Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Ze względu na możliwość wywołania poparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów, nie później niż na początku fazy zielonego pąka. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

jabłoń, grusza.

-zaraza ogniowa.

Stosować w dawkach:

a) w okresie kwitnienia:

- jabłoń: 1,5 kg/ha.
- grusza: 3,0 kg/ha.

b) w okresie wzrostu owoców:

- jabłoń: 0,75 kg/ha.
- grusza: 1,5 kg/ha.

Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.

Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

czereśnia.

-rak bakteryjny drzew pestkowych.

-Zalecana dawka: 1,5-3 kg/ha.

Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.

Środek w dawce 3 kg/ha stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, a w dawce 1,5 kg/ha w okresie kwitnienia i wzrostu owoców.

Rośliny warzywne.

ogórek (w gruncie).

-bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych.

-Zalecane dawki: 2,5-3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Wykonywać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni od fazy 2-3 liści.

pomidor (pod osłonami).

-zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość pomidora.

-Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m².

W przypadku dużego zagrożenia chorobami zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Kocide 101 WP stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości.

UWAGI:

1. W uprawach warzywnych niższe dawki środka stosować do pierwszych zabiegów, na rośliny młode.
2. Do ochrony roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi środek stosować 2-3 krotnie w odstępach co 7-10 dni.
3. W przypadku szczególnego zagrożenia bakteriozami przeprowadzić 2-3 zabiegi co 7 dni.
4. Środek polecany głównie do zapobiegawczej ochrony warzyw przed chorobami bakteryjnymi.
5. W uprawie ogórka środek może powodować lekkie żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.
6. Do cieczy użytkowej należy dodać środek zwiększający przyczepność.
7. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

III OKRES KARENCCI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

Jabłka, gruszki, czereśnie, pomidory (pod osłonami), ogórki (w gruncie): 7 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

VI PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04	Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99	Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83	Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00	Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46	Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -