

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 422/2014d z dnia 30.10.2014 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 20/2003 z dnia 28.10.2003 r.

**Posiadacz zezwolenia:** Industrias Quimicas del Valles S.A., Av. Rafael Casanova 81,  
08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Królestwo Hiszpanii, tel.: 0034 93 579 66 77, fax.:0034  
93 579 17 22, iqv@iqvagro.com

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej:**

Zakłady Chemiczne "Organika – Azot" S.A., ul. Chopina 94, 43 – 600 Jaworzno, tel.: 32 616  
44 42, fax.: 32 616 24 17, e - mail:handlowy@azot.pl

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

### KONKRET MEGA 72 WP

Zawartość substancji czynnych:

**metalaksyl** N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(metoksy-acetylo)-DL-alaninian metylu  
(związek z grupy feniloamidów) - **8%**;

**mankozeb** kompleks cynku z manebem zawierający 20 % manganu i 2,5 % cynku  
(związek z grupy ditiokarbaminianów) - **64%**.

**Zezwolenie MRiRW Nr R - 20/2003 z dnia 28.10.2003 r.  
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 101/2004o z dnia 25.02.2004 r.,  
decyzją MRiRW Nr R - 15/2006/u z dnia 31.07.2006 r. ,  
decyzją MRiRW Nr R - 100/2008 z dnia 19.05.2008 r.  
decyzją MRiRW Nr R - 143/2010d z dnia 18.05.2010 r.  
decyzją MRiRW nr R - 48/2011d z dnia 28.02.2011 r.  
decyzją MRiRW nr R - 231/2013d z dnia 26.09.2013 r.  
oraz decyzją MRiRW nr R - 422/2014d z dnia 30.10.2014 r.**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska.

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długotrzymujące się  
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



### **Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

### **I OPIS DZIAŁANIA**

KONKRET MEGA 72 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaków i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

### **II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

#### **1. ROŚLINY ROLNICZE**

##### **ZIEMNIAK**

alternarioza

**Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7 dniach.

Środkiem wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.

Uwaga: Przy dużym nasileniu choroby środek ogranicza występowanie alternariozy.

#### **2. ROŚLINY WARZYWNE**

##### **A) POMIDOR (w gruncie)**

zaraza ziemniaka

**Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, następne co 7-10 dni, przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.

##### **B) OGÓREK (w gruncie)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją następne co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.

### **C) CEBULA (w gruncie)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 700 l/ha .

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni.

Do cieczy użytkowej wskazane jest dodanie środka zwiększającego przyczepność.

### **D) ROŚLINY KAPUSTNE (rozsadniki)**

mączniak rzekomy

**Zalecana dawka: 2 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 400 l/ha.

Opryskiwać od fazy 2 liści w odstępach co 7-10 dni.

### **III OKRES KARENCJI**

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji  
ZIEMNIAKI, CEBULA - 14 DNI

POMIDOR - 7 DNI

OGÓREK - 3 DNI

ROŚLINY KAPUSTNE (ROZSADNIKI) – NIE DOTYCZY

### **IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT**

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

### **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Wskazane jest przepłukanie opakowania wodą odmierzoną do rozcieńczania środka.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

### **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

– Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Ciśnienie robocze w aparaturze zabiegowej należy zmniejszyć do połowy.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

#### **UWAGA !**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

#### **VIII ANTIDOTUM**

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

#### **XI POMOC MEDYCZNA.**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04  
 Kraków – (12) 411-99-99  
 Lublin – (81) 740-89-83  
 Łódź – (42) 657-99-00  
 Poznań - (61) 847-69-46

Rzeszów –(17) 866-40-25  
 Sosnowiec –(32) 266-11-45  
 Tarnów –(14) 631-54-09  
 Warszawa –(22) 619-66-54  
 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata  
 Data produkcji - .....  
 Zawartość netto - .....  
 Nr partii - .....