

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nordox AS**, Ostensjoveien 13, 0661 Oslo – Królestwo Norwegii, tel.: +47-22 97 50 00, fax: +47-22 64 12 08

**Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

**AGROSIMEX Sp. z o.o.**, ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (+48) 668 04 71, fax: (+48) 668 04 86, e-mail: [agrosimex@wp.pl](mailto:agrosimex@wp.pl)

**Konfeksjonerzy :**

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel/fax (+48) 63 240 01 18, e- mail: [biuro@pakon-konin.pl](mailto:biuro@pakon-konin.pl)
2. DANMAR Towarzystwo Chemiczne, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.(+48) 42 650 95 50, fax. (+48) 42 650 66 95 e-mail: [biuro@danmar.eu](mailto:biuro@danmar.eu)

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

## N O R D O X 75 W G

**Zawartość substancji aktywnej:**

miedź w postaci tlenku miedziowego (I) – 75%.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-11/2004 z dnia 09.03.2004 r.  
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 25/2005 z dnia 28. 09. 2005 r.,  
decyzją MRiRW Nr R-58/2006 z dnia 19.08.2006 r.,  
decyzją MRiRW nr R- 122/2009 z dnia 15.07.2009 r.,  
oraz decyzją MRiRW nr R - 46/2012d z dnia 13.02.2012 r.**



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



## **Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

## **I OPIS DZIAŁANIA**

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka roślin sadowniczych i pomidorów przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

## **II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

### **1. ROŚLINY ROLNICZE**

#### **a) ZIEMNIAK**

Zaraza ziemniaka.

**Zalecana dawka: 1 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Nordox 75 WG stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym, co 7-10 dni.

### **2. ROŚLINY SADOWNICZE**

#### **a) JABŁOŃ**

Parch jabłoni.

**Zalecana dawka: 0,75 - 1 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.

Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń środek stosować tylko do fazy różowego pąka. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

#### **b) GRUSZA**

Parch gruszy.

**Zalecana dawka: 0,75 – 1 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu choroby.

Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń środek stosować tylko do początku kwitnienia. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

#### **c) WIŚNIA**

Rak bakteryjny drzew pestkowych.

**Zalecana dawka**

- w okresie nabrzmiewania pąków: 2 kg/ha**
- w okresie kwitnienia i po kwitnieniu 1 kg/ha.**

Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.  
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

### **3. ROŚLINY WARZYWNE**

#### **a) POMIDOR (W GRUNCIE)**

Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka, alternarioza.

**Zalecana dawka: 1-2 kg/ha.**

Wyższą dawkę stosować przy silnym nasileniu chorób.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 700 l/ha.

Środek stosować 2-4 razy w sezonie co 10-14 dni, przemiennie z innymi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka oraz bakteryjnej cętkowatości pomidora i alternariozy. Nordox 75 WG w dawkach 1,5 kg/ha i 2 kg/ha wykazuje plonotwórcze działanie na plony.

#### **UWAGA**

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

### **III OKRES KARENCCI**

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.

jabłka, gruszki, wiśnie - 7 dni,

ziemniak - 10 dni,

pomidor w gruncie – 7 dni.

### **IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ LUDZI I ZWIERZĄT**

okres zapobiegający zatruciu.

**NIE DOTYCZY.**

### **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **VI PRZECHOWYWANIE**

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

– Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

#### **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

#### **VIII ANTIDOTUM**

**BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

#### **IX POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04  
 Kraków – (12) 411-99-99  
 Lublin – (81) 740-89-83  
 Łódź – (42) 657-99-00  
 Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów –(17) 866-40-25  
 Sosnowiec –(32) 266-11-45  
 Tarnów –(14) 631-54-09  
 Warszawa –(22) 619-66-54  
 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....